

**Sexo más seguro****Tema: Tocando base luego de tener sexo sin protección**

**Pareja 1:** Oye, te tengo que ser honesto/a. Estoy un poco freaked out porque anoche tuvimos sexo sin protección.

**Pareja 2:** ¿Por qué?

**Pareja 1:** No me gusta tomar riesgos y me preocupa el VIH y las ITS.

**Pareja 2:** Estoy seguro de que todo está bien. ¿Piensas que te estoy escondiendo algo?

**Pareja 1:** No, solo trato de cuidarme lo más posible. Y como los dos estamos viendo a otras personas, uno/a nunca sabe.

**Pareja 2:** Bueno, ya lo que pasó, pasó... no podemos volver en el tiempo.

**Pareja 1:** Pero espera, hay unas pastillas que te pueden proteger del VIH y otras ITS. (El PEP te protege si estuviste expuesto/a al VIH y doxy PEP puede prevenir otras ITS, como la clamidia, la gonorrea y la sífilis.)

**Pareja 2:** ¿Cuándo hay que tomarlas?

**Pareja 1:** Lo antes posible, dentro de 72 horas de haber tenido sexo.

**Pareja 2:** ¿Dónde se pueden conseguir esas pastillas?

**Pareja 1:** Se pueden conseguir en Planned Parenthood, en una clínica de salud local o podemos usar teleconsulta, que pueden enviar la receta a una farmacia local.

**Pareja 2:** OK, supongo que no es mala idea. ¿Quieres que lo resolvamos juntos y busquemos lo que necesitamos?

**Pareja 1:** ¡Claro! Y la próxima vez que tengamos sexo, mejor asegurémonos de estar protegidos.

**Pareja 2:** Trato hecho.